

Uso de vincristina por vía subcutánea en tratamiento de TVT



MVZ. Francisco Julián Gómez Cancino

Cedula Profesional No. 2924962. Clínica Veterinaria "El Rodeo". Baja California No.402 Col. Petrolera C.P. 96500. Coatzacoalcos, México.
Tel: 213-58-97 y 213-95-03 Email: rodeo05@prodigy.net.mx


Paciente: Zuky, criolla, recogida de la calle, se utiliza la misma dosis que por vía endovenosa solo que en forma subcutánea, se aplican 5 dosis semanales, y se presenta inflamación y excoriación (posible auto trauma), se trata con antibióticos y el resultado es bastante bueno, se realiza al final cirugía reconstructiva de vulva.

El tratamiento se inicia el día 18 de febrero y se repite los días 25 de febrero, 4 de marzo, 13 de marzo y 20 de marzo. Se anexan fotografías.



Estas tres imágenes son del día 18 de febrero, así se recibió, se puede apreciar la magnitud del problema.

En este día se aplica la primera dosis.




Estas dos fotografías son del día 25 de febrero una semana después de la primera dosis de vincristina, la involución del tejido tumoral es evidente, se observa la piel de la vulva como queda colgando en jirones





Estas otras tres imágenes son del día 13 de marzo, (el día 4 de marzo se aplicó otra dosis pero no se tomó fotografía), en la primera de estas se observa una inflamación en el sitio de aplicación, con erosión de la piel, parecía una mordida infectada, se trata también con penicilinas únicamente.

En las otras fotografías se aprecia la evolución del tumor en la vulva, el cual ha desaparecido, solo a la palpación se sienten unas zonas duras, se aplicó una cuarta dosis.



Este día es el 20 de marzo, se aplica la 5ª y última dosis, la piel de la vulva está colgando y solo queda tejido fibroso.




Estas 4 fotografías son del día 4 de abril, se aprecia en el lomo las lesiones inflamatorias las cuales a la palpación son duras y algo dolorosas, el tamaño de la vulva es casi normal y ya no se palpan módulos, se procede este día a realizar cirugía reconstructiva en la vulva porque la piel quedó colgando solo de algunas partes.





En estas tres imágenes del día 21 de abril se observa que ya no hay lesiones en piel y no quedan marcas, esto es un mes después de la última dosis de vincristina, la piel de la vulva se aprecia algo inflamada pero ya se corrigió el defecto y no hay colgajos.



Considero una buena alternativa de tratamiento en los casos en los cuales no se pueda aplicar la vía endovenosa o cuando los recursos económicos como en este caso no son suficientes para el tratamiento convencional.



Trabajo recibido el 22/03/2006, nº de referencia 040608REDVET. Enviado por su autor principal. Publicado en [Revista Electrónica de Veterinaria REDVET®](#), ISSN 1695-7504 el 01/04/06.

[Veterinaria.org®](#) - Comunidad Virtual [Veterinaria.org®](#) - Veterinaria Organización S.L.®

Se autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica en su totalidad o parcialmente, siempre que se cite la fuente, enlace con Veterinaria.org - <http://www.veterinaria.org/> y [REDVET®](#) <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet> y se cumplan los requisitos indicados en [Copyright](#) 1996 -2006