

# ZOLETIL® 50

## ANESTESICO GENERAL INYECTABLE



### CARACTERISTICAS

**ZOLETIL 50** es un anestésico general y sedante inyectable, de uso veterinario, para animales domésticos y silvestres.

**ZOLETIL 50** contiene dos moléculas sinérgicas: Tiletamina (anestésico disociativo de la familia de las fenciclidinas) que provee una analgesia y narcosis rápida y profunda, y Zolazepan (tranquilizante de la familia de las benzodiacepinas) que provee una relajación muscular intensa, además de una actividad anticonvulsiva y ansiolítica.

**ZOLETIL 50** otorga un nivel de analgesia y completa relajación muscular lo que permite una intervención quirúrgica tranquila, eliminando los movimientos reflejos atribuibles al dolor y minimizando los riesgos de choque quirúrgico.

**ZOLETIL 50** produce una completa miorelajación similar a la que provee la anestesia inhalada, resultando en condiciones para el desarrollo de cirugías abdominales y ortopédicas.

**ZOLETIL 50** posee una farmacocinética comparable de Tiletamina y Zolazepan que permiten su combinación y eliminación en tiempos similares, asegurando con ello el logro de un nivel de anestesia favorable y una recuperación rápida y tranquila.

**ZOLETIL 50** posee una rápida y efectiva inducción a la anestesia con inmediata miorelajación, siendo de 3 a 5 minutos cuando se aplica vía intramuscular y menos de un minuto cuando se aplica vía intravenosa

### COMPOSICIÓN

<b>ZOLETIL 50</b> reconstituído contiene:	
Tiletamina (clorhidrato)	125 mg
Zolazepan (clorhidrato)	125 mg
Agua estéril inyectable	5 ml

### INDICACIONES

**ZOLETIL 50** está indicado para:

- Transporte y contención de animales.
- Realización de procedimientos cortos en animales inquietos, tales como: exámenes clínicos, tatuajes, aplicación de yesos y férulas.
- Realización de cirugías menores y mayores.

### ADMINISTRACION Y POSOLOGIA

**Caninos:**

5-10 mg por cada Kg PV, por vía Intravenosa.  
7-25 mg por cada Kg PV, por vía Intramuscular.

**Felinos:**

5-7,5 mg por cada Kg PV, por vía Intravenosa.  
10-15 mg por cada Kg PV, por vía Intramuscular.

Para una amplia gama de especies silvestres y zoológicas, ver el instructivo que se encuentra dentro del estuche.

### OBSERVACIONES

- No usar Barbitúricos en la misma solución.
- No usar con drogas curariformes en el preoperatorio.
- No se deben emplear medicamentos que contengan Cloramfenicol, pues éste retrasa la eliminación de los anestésicos.
- Es aconsejable una dieta hídrica 12 horas antes como mínimo.
- Es recomendable quitar cualquier collar antiparasitario 24 horas antes.

### PRESENTACION

Caja con:

- 1 Frasco ampolla con anestésico liofilizado.
- 1 Frasco ampolla con 5 ml de solución estéril para reconstituir.

**REGISTRO SAG: N° 0737**

**USO VETERINARIO**

**Uso Veterinario**